

# Animais em vias de extinção



## Lince Ibérico

### Classificação Científica

**Reino :** Animalia  
**Filo:** Chordata  
**Subfilo:** Vertebrata  
**Classe:** Mammalia  
**Sub-classe:** Eutheria  
**Ordem:** Carnívora  
**Subordem:** Feliformia  
**Família:** Felidae  
**Género:** Lynx (Kerr 1972)  
**Espécie:** L. pardinus



**Nome Vulgar :** Lince Ibérico

**Nome Científico:** Lynx pardinus

### Distribuição:

O lince-ibérico somente ocorre em Portugal e Espanha. A população está confinada a pequenos agregados dispersos (ver mapa de distribuição), resultado da fragmentação do seu habitat natural devido a factores antropogénicos. Apenas 2 ou 3 agregados populacionais poderão ser considerados viáveis a longo termo.



### Aparência:

Felídeo de pelagem castanho-amarelada com pintas negras e cauda curta com a ponta preta. Uma característica muito particular é o facto das orelhas possuírem nas extremidades pêlos rígidos em forma de pincel. Outra característica, muito conhecida nestes felídeos, é o facto de possuírem longas patilhas que crescem progressivamente ao longo do tempo. Os seus membros são robustos, sendo os posteriores mais longos, o que lhe confere grande capacidade de impulsão, enquanto que os anteriores são mais curtos e fortes sendo por isso utilizados na captura das presas.



### Habitat e Ecologia:

Tem como habitats preferenciais os bosques e matagais mediterrânicos onde procura abrigo, utilizando também zonas mais abertas que lhe permitem capturar a sua principal presa.

Carnívoro maioritariamente crepuscular e nocturno. Alimenta-se quase exclusivamente de coelhos-bravos, no entanto, a sua dieta pode ser complementada com roedores, aves e crias de cervídeos.

### Ameaças :

A principal ameaça resulta do desaparecimento progressivo das populações de coelhos (sua principal presa) devido à introdução da mixomatose. A pneumonia hemorrágica viral, que posteriormente afectou as populações de coelhos, veio piorar ainda mais a situação do felino.

Outras ameaças:

- Utilização de armadilhas para coelhos
- Atropelamentos
- Caça ilegal

### Reprodução:

Os acasalamentos ocorrem entre Janeiro e Março e após um período de gestação que varia entre 63 e 74 dias nascem entre 1 e 4 crias. O mais comum é nascerem apenas 2 crias que recebem cuidados unicamente maternos durante cerca de 1 ano, altura em que se tornam independentes e abandonam o grupo familiar. Atingem a maturidade sexual ao fim de 1 ano ou 1,5 anos de vida e podem viver até aos 15 anos.

### Status de Conservação:

O lince-ibérico é actualmente considerado o felino mais ameaçado do mundo e encontra-se classificado como espécie Em Perigo de extinção pelos Livros Vermelhos de Portugal, Espanha e UICN. Também se encontra protegido pela Convenção de Berna e pela Convenção que regulamenta o Comércio de Espécies Selvagens (CITES - Anexo I), sendo considerado pela Directiva Habitats como uma espécie prioritária.

### Comportamento:

Animal essencialmente nocturno. Trepador, por dia pode deslocar-se cerca de 7 km. Os territórios de indivíduos do mesmo sexo normalmente não se sobrepõem. Os territórios dos machos podem-se sobrepôr a territórios de uma ou mais fêmeas.

### Fontes:

Disponíveis a 29/03/2006

- <http://carnivora.fc.ul.pt/lince.htm>
- [http://pt.wikipedia.org/wiki/Lince\\_ib%C3%A9rico](http://pt.wikipedia.org/wiki/Lince_ib%C3%A9rico)
- <http://lynx.uio.no/jon/lynx/lyxpt02p.htm>
- <http://borntobewild.planetaclix.pt/descricaoeuropa.htm>